

DEUXIÈME NOTE SUR QUELQUES COLÉOPTÈRES

DES ENVIRONS DE LANG-SONG,

par M. L. Fairmaire.

Cette seconde note concerne encore les Coléoptères recueillis à Lang-Song par M. le Capitaine Florentin. Je n'y ai ajouté que trois ou quatre espèces recueillies aussi au Tonkin par M. de Beauchène qui a déjà fourni un contingent important à la faune coléoptérique de l'Indo-Chine.

Cladognathus crenulidens. — Long. ♂ cum mandib. 25-42 mill., ♀ 30 mill. — Oblongo-elongatus, fuscus, sat nitidus; capite magno, transversim quadrato, antice vix paulo latiore, subtiliter densissime granulato, lateribus rugosius, margine antico late bisinuato, medio obtusissime angulato, mandibulis capite fere duplo longioribus, fere rectis, apice tantum paulo arcuatis, paulo reclinatis, intus multidenticulatis, basi dente valido, apicem versus dentibus 3 majoribus sat distantibus armatis, angulis antecularibus obtuse rotundatis; antennis gracilibus, elongatis, clava 4-articulata, articulo 1^o acuto; prothorace transverso, capite vix latiore, elytris fere latiore, subtiliter densissime granulato, lateribus fere rectis, basi brevissime paulo sinuatis, basi subtiliter marginata, ante angulos obliquata, his paulo productis, sed obtusis; elytris ad humeros fere dentatis, dorso subtiliter alutaceis, leviter marginatis, stria suturali vix impressa; tibiis anticis multispinosis, ceteris medio tantum unispinosis. —

Un petit individu a la tête et le corselet plus rugueux sur les côtés, les mandibules sont à peine denticulées et les fortes dents de l'extrémité ont disparu. La ♀ est plus large, les bords latéraux sont plus marginés, les mandibules extrêmement courtes, le corselet est plus angulé en arrière, les tibias antérieurs sont courts, élargis vers l'extrémité, les autres sont inermes.

Cette espèce intéressante, car les Lucanides sont rares au Tonkin, présente la forme du *gracilis* Saund., de la Chine, mais plus grande, plus large, avec les mandibules plus robustes, plus plates, multidentées, avec 3 fortes dents avant l'extrémité qui est moins arquée et bien moins aiguë et les tibias postérieurs munis d'une épine médiane; la ♀ a la tête moins rugueuse avec une petite fossette au vertex.

Cetonia Guillotii Fairm. — Le ♂ que je ne connaissais pas, diffère de la ♀ par le corps plus étroit, les élytres notablement rétrécies depuis la base et le pygidium un peu échancré à l'extrémité,

l'abdomen légèrement impressionné au milieu, le métasternum formant en avant une saillie assez étroite, plus prononcée et les tibias antérieurs fortement tridentés. Cette forme du ♂, rétrécie en arrière, lui donne un faciès tout particulier. — Lang-song (coll. du Museum).

Coræbus quadraticollis. — Long. 10-12 mill. — Modice elongatus, sat convexus, nitidus, capite prothoraceque orichalceis, elytris cœruleis, basi vage viridulo tinctis, subtus cum pedibus ænescens, griseo-puberulus; capite sat grosse punctato, inter oculos sat profunde cavato aut potius late sulcato, fronte transversim plicatula, antice bituberosa, clypeo late sinuato, antennis fusco-æneis; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice paulo angustato, lateribus antice modice rotundatis, dorso sat dense asperulo-punctato, lateribus late impresso, margine postico medio late truncato-lobato et utrinque profunde emarginato; scutello brevi, transverso, polito, fere tridentato; elytris modice elongatis, post medium leviter ampliatis, apice oblique truncatis, breviter et acute spinosulis, angulo externo fere rotundato, interno obliquo, dorso sat fortiter dense asperulo-punctatis, basi ad humeros fortiter impressis, his sat elevatis, sutura anguste elevata; subtus cum pedibus dense asperulo-punctatus, prosterno rugosulo, medio leviter late impresso, margine antico vix sinuato.

Le *facies* rappelle les espèces du groupe de *C. bifasciatus* Olivier, mais sans bandes sinueuses grisâtres sur les élytres.

Coræbus ignifrons. — Long. 12 mill. — Modice elongatus, parum convexus, postice leviter attenuatus, supra fusculo-cœrulans, modice nitidus, capite nitidissime cupreo, prothorace lateribus paulo cupreo-violascente, elytrorum margine externo angustissimo et apice cupreis, subtus cum pedibus æneus, nitidus, subtiliter albido-pubescent; capite inter oculos late ac profunde cavato, lateribus excavationis medio angulatim productis, clypeo crispato, antice sinuato, antennis fusco-æneis; prothorace brevi, transverso, elytris haud angustiore, antice fortiter angustato, lateribus rotundatis, dorso dense granulato-rugoso, lateribus plicato et impresso, medio postice breviter sulcatulo, basi medio truncato-lobato et utrinque valde sinuato; scutello brevi, transverso, medio apice acuto, disco fortiter foveato; elytris elongatis, post medium leviter sinuatis, apice late truncatis, angulo suturali obtuso, externo acutissimo, fere hamato, dorso dense punctato-granulatis, sutura elevata, disco costula parum elevata, basi medio sat fortiter impressa; subtus dense punctulato-granulosus, prosterno sat rugosulo, antice fere recto, vix late sinuato, fere triangulari, metasterno antice et postice furcatulo, abdomine leviter compressiusculo, pedibus sat gracilibus.

Remarquable par son front fortement concave, d'un cuivreux

métallique, par ses élytres tronquées à l'extrémité avec l'angle externe en pointe aiguë un peu recourbée en dessous.

Elle fait partie du groupe de *C. retrolatus* H. Deyr. et des espèces affines, à élytres subparallèles, presque aussi larges en arrière qu'à la base, tronqués à l'extrémité, et largement évidés le long de la suture.

Trachelobrachys elegans. — Long. 4 mill. — Ovatus, crassus, convexus, elytris dorso planiusculis, piceo-fuscus, setulis minutissimis griseo-albidis dense vestitus, prothorace plaga magna discoïdali, elytris utrinque macula subbasali rotunda, plaga paulo post medium, marginem nec suturam attingente, postice extus anguste prolongata, subhamata, denudatis; antennis brunneis, basi rufescentibus, ab articulo 4° valde et acute serratis; prothorace valde convexo, elytris haud angustiore, antice angustato, margine basali medio fortiter arcuato, utrinque biemarginato; scutello brevi, lato, truncato; elytris ovato-subquadratis, ad humeros angulatis, dorso depressiusculis, apice sat fortiter declivibus et obtusis, basi transversim impressiusculis; pygidio medio sulculo denudato signato; subtus magis piceo-rufescens, similiter vestitus. — Tonkin (de Beauchêne).

Cet insecte a presque le faciès d'une *Hedobia imperialis*.

Une espèce du Kiangsi lui ressemble beaucoup :

T. pictipennis. — Long. 4 mill. — Même forme et même genre de coloration, mais la vestiture est plus cendrée-roussâtre, le corselet moins rétréci en avant, la base n'a qu'une échancrure de chaque côté avec une impression au devant, la teinte foncée envahit presque tout le disque, les élytres ont de chaque côté, à la base, 3 taches dénudées, noirâtres, séparées par des nervures un peu saillantes, à vestiture cendrée-roussâtre, après le milieu les élytres sont noirâtres sauf les nervures et une bande étroite le long de la suture, allant jusqu'à l'extrémité avec quelques petites taches roussâtres avant la déclivité; les antennes, d'un roussâtre foncé, sont encore plus fortement dentées, subpectinées, plus courtes, les pattes d'un brun foncé. — Kiangsi, trouvé par M. l'abbé Potel, Lazariste, et communiqué par M. l'abbé David.

Cyrtognathus Florentinii. — Long. 43 mill. — Sat convexus, piceus, modice nitidus, prothorace piceo-rufo; capite summo rufescente, dense rugosulo-punctato, tuberculis antennariis intus impressis; antennis nitidioribus, $\frac{3}{4}$ elytrorum vix attingentibus, sat validis, articulis 6-11 dense punctatis, opacis, articulis 5 primis intus asperulis, articulis apice sat fortiter angulatis; prothorace sat brevi, utrinque acute bispinoso, angulis posticis fere rectis, subtilissime punctulato, disco medio leviter biimpresso, basi sat marginata, ad scutellum sinuata; elytris ad humeros paulo angu-

latis, dorso sat fortiter dense punctatis, intervallis alutaceis, sutura et utrinque costulis 3 paulo elevatis, duabus internis apice fere coeuntibus, angulo suturali brevissime acuto ; prosterno antice laxe asperulo, metasterno dense fulvo-pilosulo, abdomine rufo-castaneo, nitido, fere lævi, femoribus tibiisque 4 anticis subtiliter denticulatis, tibiis anterioribus rectis, femoribus posticis castaneis; ♂.

Paraît voisin du *C. falco* Th., du nord de l'Inde, mais la tête n'a que 2 carènes entre les yeux, le corselet est à peine ponctué, et les élytres n'ont que 3 côtes peu saillantes, l'angle sutural ne présente qu'une épine extrêmement petite. La coloration aussi est différente. Diffère du *granulosus* par la forme plus étroite, la coloration foncée, le corselet plus convexe, à peine ponctué, les angles postérieurs non épineux, les élytres moins convexes, plus fortement ponctuées et les antennes un peu plus courtes, les calus antennaires moins grands, moins saillants, moins fortement échancrés.

Cyrtonops tonkineus — Long. 15 mill. — Oblongus, postice vix attenuatus, fusco-niger, nitidus, femoribus medio rufo annulatis; capite rugosulo-punctato, medio sat profunde sulcato, antennis sat gracilibus, $\frac{2}{3}$ corporis paulo superantibus, palpis maxillaribus concoloribus, intus haud pilosulis, prothorace transverso, elytris angustiore, fortiter punctato, antice transversim impresso, postice trituberoso, lateribus medio dente triangulari valido armatis; scutello obtuse ogivali, medio impressiusculo; elytris ad humeros angulatim rotundatis, fortiter seriato-punctatis, punctis postice obsolescentibus, suturam versus sat inordinatis, intervallis planis, nullo modo costulatis, dense subtiliter punctatis, spatio longitudinali discoidali angusto punctis grossis destituito; subtus subtiliter, abdomine fortius ac densius punctatus, pedibus sat fortiter punctatis.

Ressemble au *punctipennis* White, de Sumatra, mais plus petit, noir avec les fémurs annelés de roux, les palpes nus, le corselet tubéreux en arrière et au milieu, et les élytres bien moins fortement ponctuées, sans traces de côtes longitudinales.

C'est une acquisition très intéressante pour la faune du Tonkin. Le genre *Cyrtonops*, si remarquable pour la longueur de ses palpes, ne compte encore qu'une espèce propre à Sumatra. White l'indique de l'Inde.

Pachydissus Langsonius. — Long 27 mill. — Oblongus, sat convexus, subænescenti-fuscus, brunneo et lutoso-cinereo nitide sericans et mutans ; fronte bisulcata, medio carinula nigra nitida signata, oculis supra sat approximatis, antennis 5 corpore longioribus, articulis intermediis inermibus 1^o crasso, irregulariter rugosoplicato; prothorace transverso, lateribus rotundato, basi constricto, dorso grosse ac irregulariter plicato, spatio medio fere lævi et sulcis

2 oblique arcuatis antice approximatis limitato ; elytris minus latis, postice attenuatis, apice utrinque sinuatis, angulo suturali spinoso, dorso obsoletissime longitudinaliter, impresso ; prosterno antice fortiter transversim plicato, abdomine parcius pubescente, medio denudato.

Ressemble extrêmement au *P. ternatensis* Fairm., un peu plus petit et plus étroit, mais distinct surtout par l'extrémité des élytres qui est tronquée avec l'angle sutural épineux et l'interne obtusément angulé ; la partie supérieure des yeux est plus étroite, les 5^e, 6^e et 7^e articles des antennes ne sont pas épineux à l'extrémité ; les pattes sont un peu moins longues et les fémurs un peu plus épais.

Stenura rufo-maculata. — Long. 19 mill. — Sat elongata, postice leviter attenuata, nigra, nitida, pilis fulvo-sericeis capite, prothorace scutelloque longe vestita, elytris breviter pilosulis, utrinque maculis 5 rufoflavis signatis, 1^a fere basali, irregulariter ovata, 2^a subhumerali, oblonga, sat minuta, 3^a transverso-obliqua ante medium, 4^a transversa post medium, 5^a subtriangulari ante apicem, his maculis suturam haud attingentibus ; capite antice transversim leviter impresso, inter antennas sulcato vertice medio subtiliter carinulato, antennis crassiusculis, medium corporis haud superantibus, apicem versus haud attenuatis, articulo 3^o quarto vix longiore ; prothorace conico-truncato, elytris angustiore, antice a basi angustato, marginibus antico et basali elevatis, antice et basi transversim impresso, angulis posticis valde exsertis, margine postico utrinque sat fortiter sinuato ; scutello triangulari, apice obtuso ; elytris ad humeros rotundatis, a basi leviter attenuatis, apice oblique truncatis, vix sinuatis, angulo externo producto, dorso subtiliter dense coriaceis, basi leviter ac breviter costulatis ; subtus cum pedibus nigra, fulvo-villosa, subtiliter coriaceo-punctulata, pedibus mediioribus.

Forme de la *quadrifasciata*, mais plus allongée, les élytres ayant des taches et non des bandes transversales ; paraît voisine de la *S. ochraceofasciata* Motch., du Japon, mais plus grande, avec les antennes entièrement noires, les élytres à taches, non à fascies, les pattes entièrement noires et le corselet à peine rugueux, sans sillon longitudinal.

La *S. Fortunei* Pasc., du Nord de la Chine, est une espèce bien différente : Long. 7 lignes. — *Atra, subnitida, capite, prothorace, elytris basi, antennis et corpore subtus, luteis ; pedibus discoloribus.*

Et Pascoe raillait agréablement : *les descriptions pour prendre date !*

Leptura (Strangalia) aurosericans. — Long. 16 mill. — Sat elongata, postice leviter attenuata, nigra, pube aureo-sulphurea

dense vestita, capitis occipite nigro, denudato, antennis sat validis, corporis medium superantibus, fuscis, basi piceis, apicem versus crassioribus, articulis 5 ultimis rufescentibus; prothorace elytris angustiore, antice angustato, et transversim sulcatulo, postice cum angulis rotundato; elytris ad humeros obliquatis, post-medium angustatis, apice emarginatis et utrinque breviter bispinosis, utrinque maculis 4 nigris, marginem nec suturam attingentibus, apicali communi, sutura et basi anguste nigris; subtus dense sulphureo-aureo-sericans, coxis 4 antici basi nigris, pedibus rufis, modice elongatis, segmentis ventralibus ultimis piceis.

Ressemble un peu à *l'aurulenta*, mais bien distincte par son corselet beaucoup plus étroit, à peine rétréci en avant, non anguleux sur les côtés, par ses élytres plus étroites, à taches noires n'atteignant pas la suture, nettement limitées, et par sa pubescence dorée très serrée; le corps est plus court et les pattes sont assez robustes.

Leptura (*Strangalia*) lateripicta. — Long. 13 mm. — Elongata, angustissima, postice angustior, flavo-testacea, vix nitidula aut opacula, antennis articulis 3 primis piceis, ceteris apice infuscatis, elytris lateribus anguste fuscis, pedibus posticis plus minusve infuscatis; capite cum oculis prothorace valde latiore, his valde convexis, fronte planata; prothorace elytris angustiore, elongato, antice attenuato, angulis posticis extus exsertis, acutiusculis; scutello oblongo-triangulari; elytris ad humeros sat angulatis, mox ante medium angustioribus, fere linearibus, apice paulo oblique sinuato-truncatis, angulo externo magis exserto; pedibus gracilibus, posticis elongatis, femoribus elytrorum apicem haud attingentibus; ♂ prothorace longiore, utrinque vitta fusca sat lata signato, elytris dense evidenter punctatis, vitta marginali fusca ante basin abbreviata et intus paulo dilatata, abdomine nitidiore, segmentis 2 et 3 basi, ultimo toto nigro-fuscis, hoc longiore, apice fortiter emarginato, bidentato, femoribus tibiisque posticis apice nigris; ♀ prothorace brevior, immaculato, antennis fuscis, elytris subtilius punctatis, vitta marginali antice interrupta, macula antica majore et distincta, femoribus posticis basi tantum rufis, tibiis posticis infuscatis, segmento ventrali ultimo integro, subtruncato.

Forme de la *S. attenuata*, mais encore plus étroite, d'une coloration différente, le ♂ est remarquable par la forme du dernier segment ventral qui rappelle celui de la *Leptura hybrida*.

DEBILIA n. g.

Caput ovatum, oculi sat convexi, intus profunde emarginati, a prothorace distantes, antennae graciles, corpore longiores ♂, apice levissime crassiores, corpore haud longiores. Articulo 1° clavato,

basi tenni, articulis 3 et 4 subtus ciliatis, 3^o sequenti parum brevior. Prothorax breviter ovatus, elytris valde angustior, antice attenuatus, dorso inæqualis. Scutellum minutum, subquadratum. Elytra elongata, planata, apice rotundata. Prosternum angustissimum, mesosternum latum, coxæ 4 anticæ globosæ, posticæ paulo distantes. Abdomen segmento 1^o elongato. Pedes graciles, 4 antici sat breves, postici elongati, femoribus omnibus clavatis, basi gracilibus, tibiis posterioribus leviter arcuatis, tarsis brevibus, articulo 1^o elongato.

Ce nouveau genre me paraît très voisin des *Merionæda*; il en diffère par la tête moins large, les yeux médiocres, les antennes longues et grêles, les élytres non subulées, recouvrant l'abdomen, tous les fémurs claviformes et les tibiais non denticulés.

D. rufoflavida. — Long. 8 à 11 mill. — Elongata; rufo-flava, modice nitida, antennis pedibusque nigris, femorum basi excepta, abdomine rarius infuscato; capite plus minusve infuscato, sat dense punctulato, inter antennas breviter sulcato, antice transversim impresso; prothorace antice angustato, basi et antice fortiter transversim impresso, lateribus medio leviter angulato, dorso tuberculis 3 lævioribus ornato, interstitiis sat dense punctulatis; elytris elongatis, planatis, lateribus sat fortiter declivibus, dorso sat dense subseriatim punctatis, subtiliter pubescentibus, apice extremo paulo lævioribus, humeris breviter elevatis.

Neanthes scutellaris — Long. 19 mill. — Oblongus, postice leviter attenuatus, piceo-fuscus, indumento pubescente cinereo variegatus; capite unicolore, medio sulcato, antennis elytris multo longioribus, cinereis, articulo 1^o fere toto, ceteris apice obscurioribus, 3^o quarto parum longiore; prothorace transverso, elytris valde angustiore, lateribus dente valido et acuto armatis, dorso antice et basi transversim vix impresso, medio et lateribus cinerascence, stria disci media denudata antice et basi abbreviata; scutello obscure cinereo; elytris apice oblique truncatulis, ad humeros rotundatim angulatis, prope scutellum utrinque elevatis, fuscis et tuberculis nitidis fuscis dense, humeris granis minoribus laxè obsitis, sutura et utrinque costulis 2 levissime elevatis, dorso medio plaga lacerata fusca, ad marginem oblique extensa, postice maculis et lituris fuscis, sat minutis, parum regularibus parce sparsutis, subtus cum pedibus obscure cinereus, segmentis ventralibus apice anguste dilutioribus, tibiis apice tarsisque paulo obscurioribus.

Ressemble assez au *N. socius* Gahan, du Tchang-Yang, mais d'une coloration plus sombre, non soyeuse, le corselet est moins étroit, moins convexe au milieu où se trouve une courte strie dénudée, les élytres sont remarquables par leur renflement de

chaque côté de l'écusson, couvert de tubercules serrés, lisses, les épaules moins granuleuses et par leur extrémité tronquée obliquement.

Zotale alternata. — Long. 12 mill. — Oblongo-elongata, sat convexa, apice attenuata, fusca, indumento cinereo fere uniformi vestita, prothorace vittis 4 obscuratis, elytris basi leviter fuscatis; capite grosse parum dense punctato, inter antennis paulo concavo, tuberculis antennariis parum distantibus, sat productis, antennis (fractis) rufescentibus, articulo 1° crasso, sat brevi, basi vix angustato, 3° quarto æquali; prothorace quadrato, latitudine fere longiore, elytris angustiore, lateribus parallelis, inermibus, dorso grosse laxè punctato, basi marginato; elytris ad humeros angulatis, fere parallelis, apicem versus attenuatis, apice oblique obtusis, dorso punctato lineatis, intervallis alternatim convexiusculis et dilutioribus, intervallo 2° basi latiore et irregulariter sat fortiter punctato, sutura paulo elevata, linea suturali striata, intervallis 3 et 5 apice conjunctis; prosterno inter coxas sat angusto, mesosterno sat elongato, truncato, segmentis ventralibus 4 primis æqualibus, pedibus modice elongatis, tibiis intermediis extuse marginatis, tarsis sat latis.

Cet insecte me paraît bien se rapporter au *G. Zotale*, bien que les tubercules antennifères ne soient pas extrêmement saillants; il se distingue de *Z. unicolor* Pasc par les intervalles des élytres alternativement relevés.

Erythrus laticornis. — Long. 18 mill. — Elongatus, postice haud ampliatus, supra rubro-sanguineus, opacus, capite summo obscuro, subtus cum pedibus antennisque niger, modice nitidus, prothorace disco nigro bimaculato; capite inter antennis fortiter impresso et sulcatulo, clypeo dense subtiliter punctato-rugosulo, antice truncato et arcuatim impressiusculo, antennis medium corporis parum superantibus, articulis 5-11 latis, compressis, opacis, angulo apicali acute spinosulo, ultimo acutissimo, 5 primis nitidulis, 1° rugosulo-punctato, supra obsolete carinulato; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine latiore, antice angustato, lateribus postice vix rotundatis, basi brevissime sinuatis, disco medio postice oblonge paulo elevato; scutello brevi, obtuso, nigro; elytris elongatis, apice conjunctim rotundatis, lateribus et apice præsertim sat crasse marginatis, dorso sat dense parum fortiter punctulatis, costa discoidali parum elevata, postice obsoleta, sutura postice elevata; subtus cum pedibus dense punctatus. — Son-Tai.

Ressemble extrêmement à l'*E. Fortunei*, de la Chine, même coloration, mais forme plus large, antennes bien plus courtes et larges avec les articles épineux à l'angle apical, corselet plus

court, à saillie médiane moins marquée et plus courte, et élytres nullement tronquées à l'extrémité.

Plutonesthes tonkinensis. — Long. 10 mill. — *Elongatus*, fere linearis, postice paulo ampliatus, niger, nitidus, elytris coccineis, capite prothoraceque subtiliter coccineo-pubescentibus ; capite producto, dense punctato, vertice transversim sulcato, antennis medium corporis paulo superantibus, ab articulo quinto compressis et latioribus, articulis primis paulo pilosulis, 2° brevissimo, 3° sequenti vix brevior ; prothorace oblongo, elytris angustiore, antice attenuato, apice transversim buplicato, ante apicem transversim impresso et lateribus leviter sinuato, dorso leviter inæquali, basi obsolete biimpresso et utrinque leviter tuberoso ; elytris elongatis, medio levissime angustatis, postice paulo ampliatis, apice rotundatis, dorso subtiliter villosulis, apicem versus longius ac densius, apice ipso fimbriato, subtiliter rugosulis, humeris lævibus ; subtus nitidior parce villosulus, pectore valde punctato, abdomine fere lævi, pedibus gracilibus, subtiliter villosulis, femoribus omnibus valde gracilibus, apice sat fortiter clavatis.

Cette espèce diffère du type générique par la tête un peu sillonnée entre les antennes, celles-ci modérément élargies, le corselet ayant deux plis au bord antérieur, les élytres sans côte distincte et sans teinte noire à l'extrémité.

Clytus (*Demonax*) Langsonius. — Long. 9 à 10 mill. — *Elongatus*, subparallelus, piceus, opacus, pube tenui griseo-cinerascente dense variegatus ; capite griseo, antice planato, medio sulcatulo, palpis rufescentibus, antennis gracilibus, corpore parum brevioribus, fulvo-piceis, pubescentibus, articulis primis subtus ciliatis, 4° 3°que apice spinula longa tenui armatis ; prothorace ovato, antice et basi æqualiter angustato, dorso subtiliter dense asperato, pube sulphureo-cinerea vestito, medio utrinque macula nigra signato, basi transversim impressa ; scutello sulphureo-griseo ; elytris parallelis, ad humeros alde rotundatis, postice attenuatis, apice fere recte-truncatis, angulo externo paulo producto, dorso griseo-cinereis, macula basali uniformi denudata, antice aperta, interdum rufo-picea, vitta ante medium oblique transversa, ad suturam antice producta, ad marginem dilatata, denudata, et vitta lata transversa post medium etiam denudata, subtus cum pedibus dense cinereo-pubescentibus, pectore albedo cincto, segmentis ventralibus apice et lateribus albidis.

Paraît bien voisin du *Clytus Bowringii* Pasc., de Hong-Kong, mais ce dernier est d'un cendré olivâtre, le corselet n'a pas de taches et les antennes auraient le 1^{er} et le 4^e article épineux. Dans notre espèce, le 3^e article est inerme chez un individu.

Clytus (*Caloclytus*) castaneorufus. — Long. 12 mill. — *Elongatus*, supra castaneo-rufescens, vix nitidulus, prothorace

medio vittula et utrinque macula nigris notato, basi utrinque macula transversa albo pubescente signato, scutello, elytris vittis 2 transversis, angustis, 1^a arcuata, 2^a mediana, ad suturam paulo adscendente et vitta ante apicem latiore, postice nebulosa albo-pubescentibus, parte apicali a vitta secunda fusca, subtus fuscus, pubescens prosterno et mesosterno albido-pubescentibus, metapleuris, metasterno basi et apice, et segmentis ventralibus 2 primis albido-pubescentibus, antennis pedibusque rufo-piceis; capite antice planato, pilis albidis dense vestito, vertice subtiliter medio sulcatulo, antennis gracilibus, elytrorum apicem parum superantibus, articulo 1^o crasso, 3^o elongato; prothorace elytris angustiore, elongato, lateribus vix arcuatis, ante basin leviter sinuatis, dorso dense subtiliter punctato-rugosulo; elytris basi truncatis, ad humeros angulatis, apice truncatulis, dorso subtilissime punctulatis, basi et apice levissime rugosulo-punctatis; pedibus elongatis, gracilibus, femoribus posticis elytra superantibus.

Ressemble beaucoup, au premier abord, au *C. Flavieri* Fairm., de Tanger; mais bien plus allongé, surtout pour le corselet, l'écusson d'un blanc de neige ainsi que 3 bandes transversales sur chaque élytre; la tête est plane entre les yeux, sans aucune carène, les côtés du corselet sont nettement sinués à la base, les élytres sont plus nettement tronquées à l'extrémité avec l'angle externe presque arrondi et la première bande des élytres n'est nullement oblique.

Clytus (Chlorophorus) Tonkineus. — Long. 13 mill. — Valde elongatus, fuscus, pube sulphureo-flavida vestitus, maculis denudatis variegatus; capite medio sulcatulo, palpis ferrugineis, antennis medium elytrorum vix superantibus, fuscis, basi rufo-piceis et subtus ciliatis; prothorace breviter ovato, medio ampliato, lateribus valde rotundatis, basi breviter sinuatis, dorso macula antica denudata, medio et lateribus ramosa; elytris ad humeros rotundatim angulatis, postice levissime attenuatis, apice oblique sinuato-truncatis, angulo externo paulo prominulo, dorso linea fusca submarginali ab humero ad ultra medium prolongata, linea altera ab humero incipiente, arcuata et ante medium cum prima conjuncta, vitta mediana transversa etiam cum prima extus conjuncta et per suturam adscendente, ante apicem macula ovata sat magna denudatis, fuscis; subtus magis cinerascens, abdomine parum villosulo, segmento ultimo apice medio minute emarginato, pedibus rufo-ferrugineis, tibiis apice, tarsis et femoribus posticis infuscatis.

La coloration de cet insecte rappelle assez celle de l'*annularis* Fab., qui se trouve dans toute la région indo-chinoise, en passant par la Birmanie; mais le corps est plus étroit, le corselet moins globuleux, plus rétréci à la base, la ligne ou bande externe des élytres est droite, les élytres sont bien plus longues.

Clytus (Chlorophorus) ovicollis — Long. 12 à 15 mill. — Elongatus, subcylindricus rufus, dense pubescens, elytris (basi excepta rufa) flavidis, utrinque vittis 3 fuscis, paulo denudatis, 1^a ante medium, lunata, suturam haud attingente, 2^a mediana, ad marginem dilatata, ad suturam antice prolongata, 3^a post medium transversa, subtus maculis pallido-sulphureo sericeis variegatus, prosterno basi utrinque vittula angusta supra adscendente et dilatata; capite subtiliter coriaceo, clypeo sat late leviter impresso, antennis gracilibus, corpore parum brevioribus, subtus basi breviter ciliatis, articulis 3^o et 5^o æqualibus, 4^o brevioribus; prothorace oblongo-ovato, basi leviter constricto, margine basali lævi, transversim impresso, paulo elevato, præsertim ad angulos, dorso dense subtiliter asperulo; scutello sat lato, subtriangulari, valde obtuso; elytris elongatis, post medium leviter attenuatis, apice parum oblique truncatis, angulo suturali sat obtuso, externo acuminato; subtus paulo nitidior, pedibus elongatis, tarsis posterioribus articulo 1^o ceteris conjunctis fere longiore.

Ressemble assez au *C. annularis* Fab., commun dans tout l'extrême Orient et au Tonkin, en diffère par le corselet plus ovale, plus allongé, par les élytres à bande antérieure remontant sur la suture, la médiane dilatée en dehors, la postérieure étroite, transversale, et par les pattes plus longues; le corselet n'a pas la tache dorsale et sa coloration est d'un roux ferrugineux ainsi que, parfois, la base des élytres; les antennes sont plus longues.

Clytus tristiculus. — Long 9 mill. — Elongatus, subcylindricus, niger, vix nitidulus, scutello et elytris fasciis tribus, 1^a ante medium, subbasali, valde obliqua, 2^a post medium recte transversa, 3^a apicali albo-pubescentibus, subtus nitidior, albido-pubescens, metasterno medio denudato, segmentis ventralibus primis late albido-fasiatis; capite dense subtiliter rugatulo, inter oculos fere striolato, clypeo haud impresso, antennis gracilibus, elytrorum medium attingentibus, apicem versus leviter crassioribus et paulo fuliginosis; prothorace ovato, basi leviter constricto, dense subtiliter asperulo; scutello triangulari; elytris parallelis, prothorace vix latioribus, apice recte truncatulis, angulo suturali obtuso, externo vix et brevissime producto, dorso subtilissime dense punctulatis; subtus vix distincte punctulatus, pedibus gracilibus, sat longe abido villosulis, femoribus paulo clavatis.

La description de l'*Anthoboscus nigerrimus* Chevr. conviendrait assez bien à cet insecte; mais il n'aurait que 5 1/3 mill., il serait hérissé de longs poils pâles, les antennes seraient presque aussi longues que le corps, le corselet globuleux, granuleux, l'écusson simplement bordé de blanc, les élytres tronquées obliquement avec des bandes disposées différemment.

Cleomenes nigricollis. — Long. 9 à 10 mill. — Elongatus, angustus, fuscus, opacus, capite et prothoracis marginibus indumento albido vestitis, elytris testaceis, sutura et ad latera maculis brunneis, intus productis et dilutis, subtus indumento albido-griseo dense vestitus, abdomine lateribus maculis fuscis sat magnis signato, ore, antennis, pedibusque dilute testaceis, femorum clava rufopicea, antennarum articulis 2 ultimis fuscatis; capite inter oculos planiusculo, his magnis, convexis, palpis brevissimis, articulo ultimo triangulari, paulo oblique truncato; antennis filiformibus, apicem versus vix sensim crassioribus, elytris haud longioribus ♀, longioribus ♂, articulo 3^o quarto longiore; prothorace fere cylindrico, latitudine sesquilongiore, elytris angustiore, dense fortiter punctato; scutello subquadrato, basi angustiore; elytris elongatis, subparallelis, apice fortiter emarginatis et acute bispinosi, dorso fortiter subseriatim punctatis et carinula tenui apice obsoleta signatis, sutura elevata; prosterno inter coxas angustato, segmento 1^o ventrali secundo longiore, pedibus gracilibus, posticis longioribus, femoribus apice sat abrupte clavatis.

Cet insecte ne diffère des autres *Cleomenes* que par les antennes à peine distinctement épaissies vers l'extrémité et plus longues ou aussi longues que le corps. Les fémurs sont notablement plus courts que les élytres, ♂♀, ainsi que le dit Pascoe, contrairement à Lacordaire.

Sclethrus stenocylindrus. — Long. 17 mill. — Valde elongatus, subcylindricus, fuscus, subopacus, antennis rufo-piceis, articulo 1^o fusco, prothorace utrinque medio macula et basi maculis 3 cœruleo squamosis, scutello, elytris guttula discoidali ante medium, striga mediana angusta, ad suturam arcuata, et vitta ante apicem cœruleo squamosis, prosterno medio, pectore lateribus et abdominis segmentis primis apice cœruleo-squamosis, pedibus rufo-piceis; capite rugosulo, inter antennas sat concavo, antice nitido, inter oculos longitudinaliter carinato, summo leviter cyanescente, clypeo impresso, palpis piceis; antennis $\frac{2}{3}$ corporis attingentibus, articulo 3^o elongato; prothorace ovato, elytris angustiore, convexo, lateribus rotundato, basi constricto et marginato, dorso subtiliter dense asperulo, angulis posticis retroversis; elytris elongatis basi truncatis, ad humeros angulatis, medio levissime angustatis, apice vix oblique truncatis, dorso sat subtiliter dense rugosulo-granulatis; subtus lævis, minus opacus, abdomine nitido, subtiliter dense rugosulo, segmento ultimo late impresso, pedibus gracilibus, elongatis, posticis longioribus.

Ressemble extrêmement au *S. amœnus* Gory, des Philippines et de Pérah, mais un peu plus grand, avec les antennes et les pattes

rougeâtres, le corselet bien plus court, ovoïde, arrondi sur les côtés, moins fortement et plus densément rugueux, les élytres mates, finement et densément rugueuses, leur extrémité plus oblique, à angle externe un peu moins saillant, la bande médiane bien nette, plus étroite, remontant davantage sur la suture, la bande antéapicale plus éloignée de l'extrémité; enfin les antennes sont ferrugineuses et les pattes plus obscures.

Apriona basicornis. — Long. 36 mill. — Oblonga, convexa, fusco-picea, indumento pubescente cinereo-umbrino vestita, elytris maculis minutis numerosis griseis variegatis; capite medio toto sat tenuiter sulcato, antennis validis, corpore brevioribus, articulo 1^o crasso, cum 2^o et 3^o et 4ⁱ basi dense umbrino vestitis, ceteris articulis fuscis, articulo 3^o quarto multo longiore; prothorace transverso, elytris multo angustiore, dorso medio grosse tuberculoso, tuberculis disci oblongis et sulco tenui separatis, lateribus subtiliter rugatulis et dente sat valido acutissimo armatis; scutello lævi, obtuso, apice obsolete sulcatulo; elytris ad humeros productis, postice levissime attenuatis, apice truncatis et utrinque acute bispinosis, dorso basi dense aspero-granulatis, dein parce punctatis, punctis parum impressis sat subtilibus; subtus pube ferruginea vestita, pectore et abdomine lateribus maculis magnis albidis ornatis, pedibus sat validis. — Tonkin (de Beauchène).

Voisine des *A. plicicollis* et *Germari*, mais très différente par son corps plus court, plus épais, ses antennes robustes, courtes, non annelées, à articles basilaires couverts d'une vestiture rubiginieuse, son corselet grossièrement tuberculé sur le disque, ses élytres finement marbrées et le dessous du corps à grandes taches blanches.

Apomecyna niveosparsa. — Long. 11 mill. — Sat elongata, convexa, fusca, indumento breviter villosa rubigineo dense vestita, sparsim plus minusve obscura ant dilutior, elytris guttis rotundatis niveis ornatis, triseriatis, serie 1^a ante medium arcuata, cum gutta interiore, 2^a post medium sat irregulari, 3^a ante apicem, transversa, guttulis 3 vel 4 composita; capite parce punctato, medio sat fortiter sulcato, antennis elytrorum medium attingentibus, unicoloribus; prothorace subquadrato, elytris paulo angustiore, grosse punctato-rugoso, immaculato; elytris ad humeros sat angulatis, apice recte truncatis, grosse substriato-punctatis, punctis apicem versus minoribus, lateribus lineato-punctatis, punctis minoribus, sutura postice paulo elevata; subtus cum pedibus unicolor, his vage fuscis annulatis.

Voisine de l'*histrio*, mais n'a pas de taches sur le corselet, celles des élytres sont disposées différemment et leur extrémité n'est pas tronquée obliquement. Ces caractères la rapprocheraient d'une

espèce de l'Assam, *A. pertigera* Th., mais celle-ci a une tache blanche à la base du corselet et la disposition des taches des élytres paraît différente, autant qu'on peut en juger par la description : six agglomérations disposées sur 3 rangs.

Albana fasciolata. — Long. 6 mill. — Oblonga, sat convexa, fusca, pube tenui griseo-cinerascente variegata, elytris post medium fasciola grisea arcuata tenui signatis; capite sat lato, fronte longitudinaliter substriata, antennis corpore vix brevioribus, articulo 1° subcylindrico, sat crasso, 3° 4° que denudatis, illo longiore, ceteris decrescentibus, prothorace valde transverso, elytris angustiore, antice et basi fere æqualiter angustato, lateribus leviter rotundatis, dorso sat dense punctulato, dorso paulo inæquali, scutello subquadrato, punctato; elytris oblongo-ovatis, postice levissime ampliatis, apice separatim rotundatis, dorso fortiter sat dense punctatis, sutura et utrinque costulis 2 paulo elevatis, 1° basi breviter sat elevata, denudata, medio utrinque fasciola oblique arcuata griseo-cinerascente, ante apicem fasciolis 2 vage ferrugineis, signatura fusca marginatis, subtus cum pedibus dense griseo-cinereo pubescens. — Tonkin (de Beauchêne).

Cet insecte me paraît bien appartenir au genre *Albana*; il diffère de l'espèce de nos pays par les élytres plus courtes, ayant la suture relevée ainsi que 2 petites côtes longitudinales, la 1^{re} relevée à sa base, prolongée presque jusqu'à l'extrémité, la 2^e visible seulement à la base, la ponctuation est beaucoup plus forte, moins serrée; leur coloration est différente et présente en arrière une bande pâle, obliquement arquée en dehors et allant rejoindre la teinte grise du bord; leur extrémité est faiblement tronquée, ou brusquement arrondie.

Saperda pseudoscalaris. — Long. 15 mill. — Sat elongata, dense velutino-pubescens, griseo-flavescens, capite vitta media et utrinque maculis 2 minutis, prothorace macula discoidali ovata, postice constricta, scutello (apice excepto) et elytris maculis 4 externis nigris, his intus profunde emarginatis, 1° humerali oblonga, ultima extus angustata et prolongata; antennis corpore vix longioribus, fuscis, articulis 9-10 griseo-pubescentibus; prothorace transverso, elytris angustiore, antice et basi fere æqualiter angustato, dorso laxè punctulato, lateribus leviter rotundatis, basi transversim depressa; scutello truncata; elytris ad humeros valde angulatis, postice levissime attenuatis, apice paulo oblique truncatis, haud sinuatis, dorso laxè punctulatis, basi grosse punctatis, extus bicostatis; subtus cum pedibus dense albido-griseo-sericans, tarsis sat latis.

Cette Saperde ressemble extrêmement à la *S. scalaris* dans sa variété d'un jaunâtre un peu verdâtre, mais les dessins noirs sont

assez différents ; la tête, faiblement creusée au milieu, a 5 bandes noires longitudinales, les externes très courtes, les antennes ne sont pas annelées, le corselet est moins court, moins carré, plus large, rétréci en avant avec les côtés plus sinués à la base et la tache discoidale rétrécie en avant, étranglée en arrière, l'écusson est noir, les élytres sont tachées à peu près de même, mais avec une rangée de taches noires en moins, à peine ponctuées, carénées le long du bord externe et tronquées un peu obliquement à l'extrémité.

Astathes janthinipennis. — Long. 11 à 14 mill. — Oblongus, crassus, rufus, rufo-villosus, modice nitidus, elytris violaceis, valdenitidis nudis, antennis articulis 6 ultimis, mandibularum apice tibiisque (basi excepta) fuscis ; capite sat fortiter parum dense punctato, inter oculos sat fortiter sulcato, antennis validiusculis subtus ciliatis, corpore brevioribus, articulo 1° supra infuscato, 2° brevissimo ; prothorace valde transverso, elytris angustiore, antice vix angustato lateribus, medio vix ampliato, dorso medio gibbosulo, antice et basi transversim impresso ; elytris sat latis, ad humeros rotundatim angulatis, apice conjunctim late rotundatis, dorso basi sublineatim punctatis, punctis sat grossis utrinque lineis 2 leviter elevatis, postice oblitteratis, et medio extus lateribus vage viridivæneo tinctis ; subtus breviter pilosulus, pedibus brevibus.

Bien voisine d'*episcopalis* et de *violaceipennis*, de Chine, mais très distincte par la coloration des antennes dont les 5 premiers articles sont roux, le 1^{er} seul ayant une tache brune en dessus ; la base des tibias est également rousse.

Linda melanoptera. — Long. 19 mill. — Elongata, nigrofusca, subopaca, capite piceo, pubescente, medio rufescente, prothorace scutelloque dilute rufis, corpore subtus flavo, vix nitidulo, subtiliter pubescente, pedibus 4 posticis nigro-fuscis, basi excepta, anticis fuscis, femoribus flavis, genubus exceptis, antennis corpore brevioribus, nigris, basi subtus ciliatis, articulo 3° leviter clavato, 1° æquali, 4° leviter arcuato et sequentibus basi pallidis, capite antice rufo, labro mandibulisque fuscis, palpis flavis ; capite medio sulcatulo, parum dense punctato, antennis validiusculis, corpore brevioribus ; prothorace transverso, longitudine duplo latiore, elytris angustiore, lateribus medio subangulatim dilatato, dorso antice transversim impresso, medio subtransversim bigibbosulo et ad latera impressiusculo ; scutello sat quadratim rotundato ; elytris elongatis, subparallelis, postice paulo ampliatis, apice obtuse rotundatis et angustissime fulvo marginatis, dorso sat dense grosse punctatis, apice obsolete punctulatis, sutura et utrinque lineolis 2 vix elevatis ; subtus subtiliter dense pubescens segmento ventrali ultimo medio lineola lævi et impressione apicali transversa signato, pedibus brevibus.

Cet insecte ressemble beaucoup à l'*Obera seminigra* Fairm. du Tchikiang, qui doit rentrer dans le genre *Linda*, lequel diffère des *Obera* par son corselet dilaté sur les côtés, plus ou moins gibbeux sur le disque, et par le front un peu concave entre les antennes. Quant à la terminaison des élytres, elle est fort variable. Le type du genre est l'*Amphionycha femorata* Chevr., de Shang-Haï. Notre espèce nouvelle ne s'en distingue que par la tête rembrunie de chaque côté, les antennes annelées de blanc à la base à partir du 3^e article, les élytres obtuses à l'extrémité avec une étroite bordure pâle et les fémurs roux dans la moitié basilaire, sauf la 1^e paire où les genoux seuls sont noirs; enfin les crochets des tarses ont à la base une large dent obtuse et non deux. La *L. seminigra* est bien plus petite, la tête est plus fortement sillonnée, les antennes ne sont annelées de blanc qu'à partir du 4^e article, les saillies discoidales n'existent pas, et sont remplacées par deux autres placées plus en arrière et sur les côtés; enfin les élytres s'élargissent aussi un peu en arrière avant l'extrémité qui est légèrement échancrée un peu obliquement.

Il y a une 4^e espèce de *Linda*, *L. fulva* de l'Inde, mais j'ignore où elle a été décrite; elle a bien la forme de la *melanoptera*, mais est d'un jaune roux en dessus avec 2 taches noires sur la tête, autant sur le corselet, le dessous du corps, les pattes et les antennes d'un brun de poix, les élytres sont assez finement, mais densément ponctuées, presque ruguleuses, ayant chacune 2 fines lignes élevées, la suture est saillante, l'extrémité est faiblement tronquée obliquement à la suture.

Obera clypealis. — Long. 13 mill. — Sat elongata, postice leviter attenuata, flava, vix nitidula, capite, antennis, elytrorum vitta marginali ante humerum abbreviata, ad apicem dilatata, et ano nigro-fuscis; capite prothorace haud angustiore, sat dense, sat fortiter punctato, clypeo lævi, vitta apicali cum palpis flavo, antennis corpore longioribus, ab articulo 4^o magis fuliginosis; prothorace quadrato, elytris angustiore, medio vix ampliato, parum dense punctato, antice et basi leviter transversim impresso; scutello subquadrato, elytris ab humeris leviter attenuatis, dorso planatis, punctis grossis seriatim impressis, his punctis ante apicem oblitteratis, spatio suturali lævi, apice truncato; subtus dilutior, lævis, subtiliter pubescens, pedibus brevibus, validis, tarsis leviter infuscatis, tibiis posterioribus paulo fuscatis.

Ressemble extrêmement à *Nupserha ambigua* Lam., des mêmes régions; la coloration serait identique si la tête de notre espèce n'était pas noire; elle est en outre assez fortement ponctuée, et sur le front on voit une ligne transversale finement saillante; la bande marginale des élytres est mieux marquée et le dernier segment

ventral est plus ou moins noir, profondément excavé chez le ♂.

Oberea atroanalisis. — Long. 18 mill. — Elongata, flavida, capite antennisque nigro-fuscis, elytris testaceo-ardesiaceis, margine externo et apice fuscis, tibiis anterioribus supra extus fusco lineatis, ceteris, basi excepta, cum tarsis infuscatis; capite brevi, prothorace latiore, sat fortiter punctato, inter antennis breviter sulcatulo, labro lævi, basi flavo-vittato, antennis corpore brevioribus, articulo 3^o quarto multo longiore; prothorace brevi, transversim subquadrato, lateribus medio leviter ampliatis, basi et antice transversim impresso, dorso parce punctato, medio paulo elevato et lævigato; scutello, brevi, truncato, elytris elongatis, basi truncatis, ad humeros sat angulatis, medio obsolete sinuatis, apice paulo oblique sinuato-truncato, angulo suturali paulo producto, externo subobtus, dorso planatis, punctis grossis subquadratis seriatim impressis, punctis apice tantum obsoletis, parte basali ad scutellum flavido vage vittulato; subtus lævis, subtiliter pubescens.

Voisine de la *nigriceps* White, de la Chine, mais les élytres sont plus ardoisées, plus fortement et plus régulièrement ponctuées, le corselet est plus large, plus court, plus renflé sur les côtés, plus relevé au milieu, le 3^e article des antennes est bien plus long que le 4^e, les pattes sont un peu différemment colorées et le labre n'a pas une bande fauve à la base.

Oberea fusciventris. — Long. 17 mill. — Elongata, rufa, dense subtiliter pubescens, elytris post basin leviter gradatim fuscatis, antennis nigris, metasterno sat fortiter punctato, utrinque macula fusca signato, abdomine toto cærulescenti-fusco, pedibus rufo-testaceis, tibiis apice tarsisque paulo infuscatis; capite brevi, prothorace vix latiore, post oculos paulo inflato, parum dense punctato, inter antennis obsolete sulcato, labro fusco, basi rufescente, mandibulis fuscis, palpis dilute testaceis; prothorace transversim subquadrato, elytris angustiore, lateribus medio haud sensim ampliatis, dorso punctis grossis parum profunde sat dense impresso, basi et antice transversim impresso; scutello subquadrato, apice sinuato; elytris elongatis basi sat latis et sat angulatis, dein fere parallelis, ante apicem tantum angustatis, apice vix oblique truncatis, angulis brevissime acutiusculis, dorso planatis, punctis grossis subquadratis-seriatim impressis, punctis apice inordinatis, intervallis externis levissime elevatis; metasterno grosse punctato et utrinque macula fusca signato, abdomine subtiliter, basi sat fortiter punctato.

Voisine de l'*atroanalisis*, mais plus allongée, la tête et l'abdomen ont des colorations très différentes, le corselet est bien moins court, non renflé latéralement, l'impression antérieure est très peu marquée,

les élytres sont plus parallèles et leur ponctuation apicale est irrégulière, mais non obsolète.

Oberea brevicollis. — Long. 15 mill. — Elongata, tota flavo-rufa, elytris vage fuscatis, margine externo et apice anguste magis fuscatis, antennis et mandibularum apice nigris; capite prothoraceque subtiliter dense velutinis, fronte medio obsoletissime impressa, clypeo recte truncato; prothorace elytris angustiore, sat brevi, lateribus vix ampliatis, antice transversim leviter, basi obsoletè impresso, disco transversim leviter elevato; scutello truncato, apice paulo elevato et sulcatulo; elytris elongatis, ante apicem leviter ampliatis, apice oblique sinuato-truncatis, angulis acutiusculis, dorso deplanatis, fortiter seriato-punctatis, punctis apicem versus obsolescentibus; subtus subtiliter pubescens, segmento ultimo medio subtiliter striato, apice infuscato, subtruncato, utrinque angulato, tibiis tarsisque vix obscurioribus, pedibus posticis gracilioribus et longioribus, tibiis levissime bisinuatis.

Ressemble à l'*O. nigriceps* de Chine, en diffère, outre la coloration de la tête, par cette dernière non ponctuée, le corselet plus court, un peu relevé transversalement au milieu, les pattes plus grêles, les postérieures plus longues avec les tibias légèrement bisinués, et le dernier segment ventral finement sillonné au milieu avec l'extrémité seule brunâtre.

Ressemble aussi beaucoup à l'*O. holoxantha* Fairm., du Tonkin, mais cette dernière a le corselet plus bombé au milieu, impressionné à la base et de chaque côté, les points des élytres sont bien plus gros, plus carrés, et les pattes postérieures sont plus courtes avec les tibias droits.

Oberea longulipennis. — Long. 14 à 17 mill. — Valde elongata, linearis, rufa, elytris vix obscurioribus, margine externo anguste et apice paulo fuscatis, antennis fuscis, subtus dense subtiliter pubescens, pedibus brevibus, gracilibus; capite punctulato, inter antennas sulcatulo, clypeo nitido, antennis sat gracilibus, corpore paulo brevioribus, subtus subtiliter ciliatis, articulo 3^o quarto æquali; prothorace quadrato, elytris parum angustiore, lateribus fere parallelis, antice transversim vix impresso, dorso æquali, parum dense punctulato; scutello quadrato; elytris valde elongatis, subparallelis, ante apicem vix angustulis, apice oblique sinuato-truncatis, angulo externo sat prominente, suturali minus, dorso planiuseulis, seriatim punctatis, punctis apice oblitteratis; subtus dense subtiliter pubescens, pedibus brevibus, sat gracilibus.

Ressemble aux espèces précédentes par sa coloration et sa sculpture, mais bien distincte par la longueur des élytres et le corselet carré, à peine impressionné en avant et à la base.